



# 令和8年度 水稲防除こよみ

●富山市農業協同組合  
●富山農林振興センター  
(農薬名は農協の推奨品目です)  
(農薬の登録は令和7年12月現在で)

## 【本田防除体系】



## 【除草体系】



## 育苗期防除

防除時期	対象病害虫	農薬名	特徴・使い方	施用日
育苗器材の消毒	育苗雑菌	イチバン	・500倍液(水250ℓにイチバン500mlを溶かす)に瞬間浸漬する	
種籾の消毒	もみ枯細菌病 苗立枯細菌病 褐条病 ばか苗病 いもち病	モミガードC水和剤	・種籾をモミガードC水和剤200倍液に24時間浸漬する ・種子袋に種籾は五分目程度入れる ・消毒中に2~3回薬液を攪拌する ・浸漬時に最初の3日間は水交換しない	
播種時から緑化期 但し、移植15日前まで	ピシウム菌 フザリウム菌 リゾーブス菌 ムレ苗防止	ナエファインフロアブル	・1箱当たり1,000倍液を500ml灌注(ナエファイン1本100mlで200箱分)	
播種時から緑化期	リゾーブス菌 トリコデルマ菌	ダコレート水和剤	・1000倍液を1箱あたり1ℓ灌注 ・播種14日後まで	

## 本田防除(粉剤)

防除時期	対象病害虫	農薬名	散布量(10a当り)	特徴・使い方	安全使用基準(収穫前日数)	施用日
出穂10~14日前	いもち病 紋枯病	ノンラスパリダ粉剤DL	4kg	・ごま葉枯病にも登録あり	14日	
穂揃期	いもち病 カメムシ類 ウンカ類	ラフサイドキラップ粉剤DL	4kg	・殺虫・殺菌剤 ・カメムシ防除に効果大	14日	
傾穂期	カメムシ類 ウンカ類	スタークル粉剤DL	3kg	・カメムシ防除に効果大 ・長期間効果が持続する	7日	

## 除草剤

種類	農薬名	特徴・使い方	施用日
初期剤	ピラクロン粒剤	・田植同時散布できる初期剤	1kg/10a
	マーシエット粒剤	・田植後3日から5日まで	
初・中期一発剤	ゼータプラス粒剤	・田植直後からノビエ4.0葉まで 但し、収穫60日前まで ・田植同時散布可能	1kg/10a
	ベッカク粒剤	・田植直後からノビエ3.0葉まで 但し、移植後30日まで ・田植同時散布可能	1kg/10a
	デオーレ粒剤	・田植直後からノビエ3.0葉まで 但し、移植後30日まで ・田植同時散布可能	1kg/10a
	カチドキZ粒剤	・田植直後からノビエ3.0葉まで 但し、移植後30日まで ・田植同時散布可能 ※直播登録無	1kg/10a
投げ入れ剤	プライオリティジャンボ	・田植直後からノビエ3.5葉 但し、移植後30日まで 10パック(250g)/10a	
	クサウエポンジャンボ	・田植後1日からノビエ3葉 但し、移植後30日まで 10パック(400g)/10a	
中・後期剤	ウィードコア粒剤	・田植後7日からノビエ4.0葉 但し、収穫60日前まで ・ノビエ+広葉雑草	1kg/10a
	ワイドショット粒剤	・田植後15日からノビエ4.0葉まで 但し、収穫45日前まで ・ノビエ+広葉雑草	1kg/10a
	トドメMF粒剤	・田植後14日からノビエ5.0葉まで 但し、収穫50日前まで ・ノビエ専用剤	1kg/10a
	バサグラン粒剤	・田植後15日から収穫45日前まで ・広葉雑草が対象。落水散布で3~4日間入水しない	3~4kg/10a
投げ入れ剤	ヒエクリーン豆つぶ250	・田植後15日からノビエ4.0葉まで 但し、収穫45日前まで ・ノビエ専用剤	250g/10a
	テッケンジャンボ	・田植後15日からノビエ4.0葉まで 但し、収穫60日前まで ・ノビエ+広葉雑草	10パック(500g)/10a
	レプラスギアジャンボ	・移植後14日からノビエ4.0葉まで、但し、収穫60日前まで ・ノビエ+広葉雑草	10パック(300g)/10a
	ウィードコアジャンボSD	・移植後10日からノビエ4葉まで、但し、収穫60日前まで ・ノビエ+広葉雑草 10パック(200g)/10a ※直播登録無	
液剤	クリンチャーバスME液剤	・田植後15日からノビエ5.0葉まで 但し、収穫50日前まで ・落水散布ノビエ+広葉雑草 薬量1,000ml/10a 散布量70~100ℓ/1	

## 苗箱防除

防除時期	対象病害虫	農薬名	散布量	特徴・使い方	安全使用基準(収穫前日数)	施用日
播種同時 又は移植当日	いもち病 紋枯病 穂枯れ(ごま葉枯病) 白葉枯病 内籾褐変病 イネドロオウムシ イネミズゾウムシ ニカメイチュウ イネソウムシ イナゴ類	ブーンレパード箱粒剤	50g/箱	・播種時に散布することで省力化 ・定量を均一に散布 ・紋枯病にも効果あり ・初期害虫にも効果あり ・高密度は種に登録あり ・高密度は種に播種する場合は50~100g/箱(1kg/10a)	播種時覆土前 移植当日	

## 本田防除(粒剤)

防除時期	対象病害虫	農薬名	散布量(10a当り)	特徴・使い方	安全使用基準(収穫前日数)	施用日
出穂10日前	いもち病 ニカメイチュウ ウンカ類 カメムシ類	フジワンラップ粒剤	4kg	・殺虫・殺菌剤 ・散布時は水深3cm以上で3~4日は湛水状態で	30日	

## 本田防除(液剤)

防除時期	対象病害虫	農薬名	散布量(10a当り)	特徴・使い方	安全使用基準(収穫前日数)	施用日
穂揃期	いもち病 カメムシ類 ウンカ類	ラフサイドK2フロアブル	1,000倍液 60~150ℓ/10a	・殺虫・殺菌剤 ・カメムシ防除に効果大	14日	
傾穂期	カメムシ類 ウンカ類	スタークル液剤10	1,000倍液 60~150ℓ/10a	・カメムシ防除に効果大 ・長期間効果が持続する	7日	